



## Composizione

Boro (B) solubile in acqua **11%**

## Formulazione

Liquido

## Confezioni

**1 kg** (collo da n° 10 pz.)



## Concime liquido contenente Boro per applicazioni fogliari

Concime CE - Concime borato in soluzione (Boro da etanolammina)

**Vitabor L** è un integratore fogliare liquido ad elevato contenuto in boro. La particolare formulazione, consente un rapido ed elevato assorbimento; il boro è specifico per bilanciare e regolare la crescita di fiori, frutti e radici. Previene inoltre manifestazioni di "boro carenza".

## Una scelta vincente

Elevata penetrazione fogliare e mobilità verso i tessuti. Migliora l'allegagione e la formazione dei frutti. Riduce o evita specifiche "fisiopatie", come la colatura dei fiori della Vite.

## Consigli d'impiego

| Colture                          | Epoca d'impiego                                                       | Dosi (g/hl) | Dosi (kg/ha) | Note                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vite, Uva da tavola</b>       | In pre e post-fioritura.                                              | 100-150     | 1-1,5        | Migliora l'allegagione, riduce l'acinellatura verde.                                                                                                                                                         |
| <b>Olivo</b>                     | Dalle prime fasi vegetative.                                          | 100-150     | 1-1,5        | Attiva lo sviluppo vegetativo, controlla la "leptonecrosi". Riduce malformazioni di foglie e drupe.                                                                                                          |
| <b>Actinidia, Fruttiferi</b>     | Dalla pre-fioritura, 2-3 applicazioni.                                | 100-200     | 1-2          | Migliora l'allegagione, la differenziazione delle gemme. Riduce la crescita stentata e la suberificazione dei frutti.                                                                                        |
| <b>Ortaggi, Fragola</b>          | Dalla pre-fioritura, o al manifestarsi dei primi sintomi.             | 150-200     | 1,5-2        | Migliora la fioritura e l'allegagione. Riduce la malformazione delle foglie e dei frutti. Previene il rachitismo del sedano.                                                                                 |
| <b>Barbabietola da zucchero</b>  | Dai primi stadi vegetativi, 2-3 applicazioni.                         | 200-250     | 2-2,5        | Incremento del peso della pianta con aumento del tenore zuccherino e della sua estraibilità. Stimola l'apparato radicale garantendo il buon equilibrio idrico. Riduce i rischi di comparsa del "cuore cavo". |
| <b>Agrumi</b>                    | Dall'inizio della nuova vegetazione, 2 applicazioni                   | 100-150     | 1-1,5        | Migliora lo sviluppo vegetativo, equilibra la pianta.                                                                                                                                                        |
| <b>Tabacco</b>                   | Prima dell'accrescimento, 2 interventi a distanza di 20 giorni.       | 200-300     | 2-3          | Previene e riduce la crescita stentata ed il rachitismo.                                                                                                                                                     |
| <b>Vivai, Fiori, Ornamentali</b> | Durante le fasi iniziali, prima della formazione dei bottoni fiorali. | 150-200     | 1,5-2        | Migliora la forma, il colore e la dimensione dei fiori, con foglie più uniformi.                                                                                                                             |

*In serra su tutte le colture ridurre le dosi a 60-80 g/hl*

## Miscibilità

Evitare miscele con prodotti alcalini, rameici o a base oleosa e distanziare di almeno 10 giorni eventuali applicazioni con tali prodotti. Escludendo le classi di prodotti sopracitati, il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati. Tuttavia è sempre consigliabile effettuare piccoli saggi preliminari per verificare la compatibilità e eventuali sensibilità varietali. Non miscelare con prodotti a base di Calcio.

## Avvertenze

Effettuare le applicazioni nelle ore più fresche della giornata. Agitare bene prima dell'uso. In ambiente protetto (serre, tunnels, ecc.) ridurre opportunamente le dosi di impiego del 20-30%. Conservare in luogo fresco ed asciutto.